

# 嚴重特殊傳染性肺炎 (Severe Pneumonia with Novel Pathogens)

109年2月15日

## 一、臨床條件

具有下列任一個條件：

- (一) 發燒 ( $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ) 或急性呼吸道感染。
- (二) 臨床、放射線診斷或病理學上顯示有肺炎。

## 二、檢驗條件

具有下列任一個條件：

- (一) 臨床檢體(如咽喉擦拭液、痰液或下呼吸道抽取液等)分離並鑑定出新型冠狀病毒。
- (二) 臨床檢體新型冠狀病毒分子生物學核酸檢測陽性。

## 三、流行病學條件

發病前 14 日內，具有下列任一個條件：

- (一) 曾去過一級流行地區\*，或曾接觸來自一級流行地區\*有發燒或呼吸道症狀人士。
- (二) 曾有中國大陸(含港澳)之旅遊史或居住史。
- (三) 曾經與出現症狀的極可能病例或確定病例有密切接觸，包括在無適當防護下提供照護、相處、或有呼吸道分泌物、體液之直接接觸。

\*目前為中國大陸湖北省、廣東省、河南省、浙江省  
(流行地區將隨疫情適時更新並公布)

## 四、通報定義

具有下列任一個條件：

- (一) 符合臨床條件任一項及流行病學條件(一)或(三)。
- (二) 符合臨床條件(二)及流行病學條件(二)。
- (三) 符合檢驗條件。

## 五、疾病分類

- (一) 極可能病例：雖未經實驗室檢驗證實，但符合臨床條件，且於發病前 14 日內，曾經與出現症狀之確定病例有密切接觸者。
- (二) 確定病例：符合檢驗條件。

## 六、檢體採檢送驗事項

| 傳染病名稱     | 採檢項目       | 採檢目的           | 採檢時間              | 採檢量及規定                    | 送驗方式                   | 應保存種類<br>(應保存時間)        | 注意事項  |
|-----------|------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| 嚴重特殊傳染性肺炎 | 咽喉擦拭液      | 病原體檢測          | 發病 3 日內           | 以無菌病毒拭子之棉棒擦拭咽喉，插入病毒保存輸送管。 | 2-8°C (B類感染性物質 P650包裝) | 病毒株(30日)；<br>咽喉擦拭液(30日) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 醫師可視病情變化再度送檢。</li> <li>2. 見 2.8.5 備註說明及咽喉採檢步驟請參考第 3.7 節。</li> <li>3. 建議使用有 o-ring 或其他防滲漏設計之檢體容器送驗，若檢驗單位發現檢體滲漏，則不予檢驗。</li> </ol> |
|           | 痰液或下呼吸道抽取液 |                |                   | 以無菌容器收集排出之痰液。             |                        | 病毒株(30日)；<br>痰液(30日)    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 適用於輕症咳嗽有痰、肺炎或重症者。</li> <li>2. 醫師可視病情變化再度送檢。</li> <li>3. 勿採患者口水。</li> <li>4. 痰液採檢步驟請參考第 3.9 節。</li> </ol>                        |
|           | 血清         | 抗體檢測<br>(檢體保留) | 急性期<br>(發病 1-5 日) | 以無菌試管收集至少 3 mL 血清。        |                        | 血清(30日)                 | 血清檢體見 2.8.3 及 2.8.4 備註說明及血清採檢步驟請參考第 3.3 節。  |